

NOS ESFORZAMOS EN BRINDAR UN TRATAMIENTO HOLISTICO, ADECUADO, Y SIN PREJUICIOS, QUE REDUZCA BARRERAS Y MEJORE LA SALUD DE NUESTROS PACIENTES.



Nuestra Misión

HealthFirst se enorgullece de proporcionar atención medica de la más alta calidad a todas las personas en nuestra diversa comunidad.

387 Quarry Street, Suite 100
Fall River, MA 02723

508-679-8111

Cobertura de Llamadas de Emergencia 24/7

Visite nuestro sitio web **www.healthfirstfr.org** para saber de todos los servicios ofrecidos en HealthFirst y nuestro horario actual de funcionamiento.



TRATAMIENTO PARA LA HEPATITIS C

Lo Que Se Debe Esperar

SU TERAPIA CONSISTE EN

Sofosbuvir/Velpatasvir = Epclusa

- 1 comprimido por día durante 12 semanas
- Tomar con o sin comida.
- Almacenar a temperatura de ambiente.
- Los medicamentos antiácidos pueden disminuir la eficacia de Epclusa, hable acerca de esto con su proveedor de salud.

Si se olvida de una dosis:

- NO deje de tomar sus medicamentos sin hablar con su proveedor de salud.
- Si sale de viaje lleve consigo sus medicamentos.
- ¡SI SE OLVIDA DE UNA DOSIS! Tome LA DOSIS OLVIDADA EL MISMO DÍA tan pronto como se acuerde.
- No tome más de un comprimido por día



LO QUE SE DEBE ESPERAR

Antes del Tratamiento

- Hable con su proveedor de salud para revisar su historial médico, medicamentos actuales y el plan de tratamiento

Durante el Tratamiento

- Mantener todas las consultas médicas y de laboratorio.
- Tome su medicamento todos los días.
- Rellene sus medicamentos a tiempo.
- Evite el alcohol y las drogas de la calle.
- Hágale saber a su proveedor de salud si:
 - hay cambios en su salud
 - hay cambios en la medicación
 - ha perdido sus medicamentos
 - ha cambiado su número de teléfono o dirección
 - ha olvidado múltiples dosis de sus medicamentos de terapia

MANEJO DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS

Dolor de Cabeza (18-32%)

- Hidrátese/descanse.
- Tylenol según lo aconsejado por su proveedor de salud.

Cansancio (15-26%)

- Hidrátese.
- Salga a caminar.
- Conserve una alimentación bien equilibrada.

Goteo Nasal-Congestión y Dolor de Garganta (6-13%)

- Hidrátese.
- Use pastillas de chupar para el dolor de la garganta.
- Tylenol

Náusea (10-24%)

- Coma pequeñas porciones
- Jengibre
- Galletas salinas

Insomnio (4-11%)

- Evite la cafeína.
- Evite las comidas fuertes antes de la hora de dormir.

